

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
CDDP・ADR療法	シスプラチン	CDDP	50mg/m <sup>2</sup>	day1	3週毎投与	short hydration 可 *子宮体癌
	ドキシソルビシン	ADR	60mg/m <sup>2</sup>	day1		
CDDP・CPT-11療法	シスプラチン	CDDP	60mg/m <sup>2</sup>	day1	4週毎投与	short hydration 可 *卵巣癌
	イリノテカン	CPT-11	60mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
CBDCA・PAC療法 (一括投与)	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1	4週毎投与	*子宮頸癌・卵巣癌
	パクリタキセル	PAC	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
CBDCA・PAC療法 (分割投与)	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1	3-4週毎投与	DD-TC療法 *卵巣癌
	パクリタキセル	PAC	80mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
Bev+CBDCA・PAC療法	ベバシズマブ	Bev(B-mab)	15mg/kg	day1	4週毎投与	*卵巣癌
	カルボプラチン	CBDCA	AUC:6	day1		
	パクリタキセル	PAC	60mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
CBDCA・GEM療法	カルボプラチン	CBDCA	AUC:5	day1	3週毎投与	*卵巣癌
	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8		
Bev+PLD療法	ベバシズマブ	Bev	10mg/kg	day1,15	4週毎投与	*卵巣癌
	リポソーマルドキシソルビシン	PLD	40mg/m <sup>2</sup>	day1		
Bev療法(maintenance)	ベバシズマブ	Bev	15mg/kg	day1	3週毎投与	前治療のBev併用レジメンに続いて使用可

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
PLD療法	リポソーマルドキソルビシン	PLD	50mg/m <sup>2</sup>	day1	4週毎投与	*卵巣癌
weekly PAC療法	パクリタキセル	PAC	80mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週毎投与	*卵巣癌
DOC療法	ドセタキセル	DOC	70mg/m <sup>2</sup>	day1	3週毎投与	*卵巣癌
GEM療法	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週毎投与	*卵巣癌
CPT-11療法(A法)	イリノテカン	CPT-11	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週毎投与	*卵巣癌
NGT療法	ノギテカン	NGT	1.5mg/m <sup>2</sup>	day1-5	3週毎投与	*卵巣癌
CBDCA療法	カルボプラチン	CBDCA	AUC:5	day1	3週毎投与	*卵巣癌、患者限定登録

(内服薬単独)

レジメン名	使用薬剤	略号	投与量	投与スケジュール		備考
Etoposide	エトポシド	VP-16	50mg/m <sup>2</sup>	day1-21	4週毎投与	*卵巣癌
Olaparib	オラパリブ		300mg/m <sup>2</sup> × 2/day	day1	連日服用	*Pt製剤感受性再発卵巣癌の維持療法